

GUIA DE ATENCIÓN DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE TRIQUINIOSIS

Material elaborado por el comité de crisis convocado por el H.D Región Sanitaria III, conformado por el Equipo técnico de la Región Sanitaria III, representantes de la Secretaría de Salud de los Municipios de Chacabuco y Junín, médicos infectólogos de centros oficiales y privados de la Jurisdicción, el día 3 de junio de 2014.

Definición de Caso sospechoso de triquinosis: Toda persona de cualquier edad y sexo que consulte a su médico o establecimiento de salud en su localidad, presentando mialgias intensas, fiebre y edema facial y/o bupalpebral, con antecedente de haber consumido productos de cerdo sin cocción o insuficientemente cocida, a partir del día 1 de abril de 2014.

Ante la presencia de un caso sospechoso de triquinosis:

- Diagnóstico:

- 1.- Solicitar laboratorio:

- Hemograma completo con fórmula
- hepatograma
- CPK
- Serología para triquina

- 2.- Completar la **Ficha Epidemiológica de denuncia obligatoria por duplicado.**

Una se entregará al paciente, con las órdenes de laboratorio **dentro de las 24 hs.**

El duplicado se remitirá en el mismo plazo no mayor a 24 hs, a la Dirección de Salud de su municipio.

En caso de no contar con la misma, consignar en la orden de laboratorio los siguientes datos del paciente:

- Apellido y nombre
- Edad
- Sexo
- Domicilio
- Localidad
- **Teléfono**
- Ocupación
- Producto ingerido
- Fecha de ingesta
- Síntomas principales
- Fecha de inicio de síntomas

- Tratamiento sugerido

Albendazol 400 miligramos cada 12 horas por 7 días o Mebendazol 400 miligramos cada 8 horas por 10 días.

Uso de corticoides:

Se sugiere: metilprednisolona de 30 a 60 miligramos días hasta 1 miligramo/kg/día.

Se aconseja su utilización precoz ante la presencia de:

- Mialgia invalidante
- Fiebre persistente por 3 o más días
- Síntomas cardiovasculares
- Eosinofila mayor de 1000 elementos por mililitros.

- Otras recomendaciones:

- Realización de ECG dentro de los 7 días. Eventual consulta especializada/Ecocardiograma, etc.
- Control de hepatograma a los siete días de tratamiento.
- Toma de 2° muestra de sangre, a los 14 días de la primera, para confirmación diagnóstica.
- El Albendazol y Mebendazol están contraindicados en menores de 2 años de edad y embarazadas

Indicaciones de internación

- Compromiso cardiovascular.
- Niños menores de 2 años de edad.
- Embarazadas en cualquier edad gestacional.
- Compromiso del Sistema Nervioso:
 - Encefalitis
 - Meningitis
 - Signos de foco neurológico
 - Ataxia
 - Diplopía
 - Parálisis facial
 - Trismus.
- Gravedad del cuadro clínico.

FLUJOGRAMA DE MANEJO DE FICHA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA



